

Laxuave® Balance Polietilenglicol 3350

Laxante

Actúa
aumentando
la cantidad
de agua en
el intestino

Alivia la
constipación

No tiene
sabor,
ni azúcar

Polvo para
solución oral

Envases
Conteniendo 238g

Industria Argentina - Venta libre



ELEA

Laxuave® Balance Polietilenglicol 3350

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE CONSUMIR LAXUAVE® BALANCE, conserve este prospecto, contiene información que puede ser útil volver a leer.

¿Qué contiene Laxuave® Balance?

Cada 17 gramos de Laxuave® Balance (equivalente a 1 dosis) contiene: Principio Activo: Polietilenglicol 3350 17 gramos. No contiene principios inactivos o excipientes.

¿Qué es Laxuave® Balance?

Laxuave® Balance es un laxante que actúa aumentando la cantidad de agua en el intestino estimulando sus movimientos y mejorando la evacuación en personas con constipación ocasional. No tiene sabor, ni contiene azúcar.

¿Para qué se utiliza Laxuave® Balance?


Laxuave® Balance se utiliza, a corto plazo, para el alivio de la constipación o estreñimiento ocasional, cuando las medidas higiénico dietéticas han fracasado.

¿Cómo se utiliza Laxuave® Balance?

Laxuave® Balance debe ser administrado exclusivamente por vía oral. Para los adultos y mayores de 18 años la dosis diaria es una (1) dosis de 17 gramos, por la noche después de la cena, una hora antes de acostarse. Para la presentación en frasco (una) dosis de 17 gramos equivale a llenar el vaso dosificador hasta el relieve según consta en la Figura 1. Coloque el polvo de una dosis en un vaso (120 a 230 mililitros) de una bebida fría o caliente, como agua, jugo, soda, café o té. Mezcle bien el polvo y tómela de inmediato. No la guarde para más tarde. No use Laxuave® Balance más de una vez al día. Puede utilizarse todos los días hasta que su evacuación intestinal se normalice o hasta completar 5 días de tratamiento; si la constipación no mejora o empeora consulte con su médico. Laxuave® Balance suele producir un movimiento defecatorio dentro de 1 a 3 días de comenzar a utilizarlo. La duración del uso de Laxuave® Balance no debe ser mayor a 5 días seguidos. Si luego de este lapso persiste la constipación, consulte a su médico.

¿Qué personas no pueden tomar Laxuave® Balance?

NO USE este medicamento si usted: • Es alérgico al principio activo Polietilenglicol. • Padece una obstrucción o un estrechamiento del intestino. • Tiene una oclusión aguda del intestino con parálisis de los movimientos intestinales (Ileo paralítico). • Padece de enfermedades inflamatorias del intestino como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. • Sospecha que puede tener apendicitis. • Presenta dolor



Vaso
Dosificador

1 vez
por día

1 dosis
= 17 gramos

Figura 1

fuerte en el abdomen. • Presenta sangrado por el ano. • Padece de cambios súbitos en su defecación que persisten más de dos semanas. • Tiene imposibilidad de defecar luego de utilizar un laxante. • Menor de 18 años.

¿Qué cuidados debo tener antes de tomar Laxuave® Balance?

Consulte a su médico si usted tiene: • Constipación desde hace más de una semana. • Sangrado rectal. • Si bajó considerablemente de peso. • Si notó una modificación repentina en su defecación que persisten por más de dos semanas. • Si Ud. está en tratamiento con anti diarreicos. • Si usted recibe algún otro medicamento. • Está embarazada o en período de lactancia.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando Laxuave® Balance?

Los efectos no deseados causados por este medicamento suelen estar relacionados con el tubo digestivo; son consecuencia de la expansión del contenido y al aumento de los movimientos del intestino. Muy raramente pueden aparecer los siguientes efectos no deseados: dolor abdominal, diarrea, vómitos, náuseas, hinchazón del abdomen, gases, reacciones alérgicas en la piel, urticaria, picazón, dificultad para respirar, dolor de cabeza e hinchazón de las piernas.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si tome más cantidad de la necesaria?

Si usted ha tomado más Laxuave Balance de lo indicado en este prospecto, consulte a su médico. Ante una sobredosis accidental vaya al lugar más cercano de asistencia médica (concurra al médico) o llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones: Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 - Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / (011) 4658-7777 - Hospital de Niños Pedro Elizalde (011) 4300-2115 - Centro Nacional de Intoxicaciones Tel.: 0800-3330-160.

Presentación:

Frasco x 14 dosis de 17 gramos, contenido neto 238 gramos.

¿Cómo guardar este producto?

Modo de conservación: conservar a temperatura no mayor de 30° C, protegido de la humedad, en su envase original. Verifique la fecha de vencimiento antes de tomar este o cualquier medicamento.

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MEDICO Y/O FARMACEUTICO.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud - Certificado N° 57.641. Elaborado en Fray Cayetano Rodríguez 3520, Ciudadela, Buenos Aires. Laboratorio Elea S.A.C.I.F. y A., Sanabria 2353, CABA. Director técnico: Fernando G. Toneguzzo, Farmacéutico.

¿Dudas? ¿Consultas?
0800-333-3532 (ELEA)

Anmat responde:
0800-333-1234